



Производитель благодарит Вас за выбор препарата Клотримазол и гарантирует его высокое качество.

## ИНСТРУКЦИЯ по медицинскому применению препарата **КЛОТРИМАЗОЛ**

Регистрационный номер: № P N001922/01  
Торговое название препарата: Клотримазол  
Международное непатентованное название: клотримазол  
Лекарственная форма: таблетки вагинальные

### Состав:

1 вагинальная таблетка содержит:  
*активное вещество*: клотримазол 100 мг.  
*вспомогательные вещества*: лактозы моногидрат, крахмал картофельный, кислота адипиновая, повидон, полисорбат 80, целлюлоза микрокристаллическая, натрия гидрокарбонат, магния стеарат.

### Описание

Таблетки двояковыпуклые овальной формы белого или почти белого цвета.

**Фармакотерапевтическая группа:** противогрибковое средство

**Код АТХ [G01AF02].**

### Фармакологические свойства

Клотримазол – производное имидазола, является противогрибковым средством широкого спектра действия для местного применения. Антимикотический эффект связан с нарушением синтеза эргостерина, входящего в состав клеточной мембраны грибов, что изменяет проницаемость мембраны и вызывает последующий лизис клетки. В малых концентрациях действует фунгистатически, а в больших – фунгицидно, причем не только на пролиферирующие клетки. В фунгицидных концентрациях взаимодействует с митохондриальными и пероксидазными ферментами, в результате чего происходит увеличение концентрации перекиси водорода до токсического уровня, что также способствует разрушению грибковых клеток.

Эффективен в отношении дерматофитов, дрожжеподобных и плесневых грибов, а также возбудителя разноцветного лишая (Pityriasis versicolor) и возбудителя эриотрихоза. Оказывает антимикробное действие в отношении грамположительных (стафилококки, стрептококки) и грамотрицательных бактерий (Bacteroides, Gardnerella vaginalis), а также в отношении Trichomonas vaginalis.

### Фармакокинетика

При применении клотримазола интравагинально абсорбция составляет 3-10 % введенной дозы. Высокие концентрации в вагинальном секрете и низкие концентрации в крови сохраняются в течение 48-72 часов. В печени быстро метаболизируется до неактивных метаболитов.

### Показания к применению:

- генитальные инфекции, вызванные дрожжеподобными грибами рода Candida и/или Trichomonas vaginalis (кандидозный вульвовагинит, трихомоноз);
- генитальные суперинфекции, вызванные микроорганизмами, чувствительными к клотримазолу.

### Противопоказания

Повышенная чувствительность к клотримазолу или вспомогательным веществам, I триместр беременности. Следует избегать применения таблеток в период менструации.

С осторожностью – период лактации.

### Применение во время беременности и в период кормления грудью

При клинических и экспериментальных исследованиях не было установлено, что применение препарата в период беременности или в период кормления грудью оказывает отрицательное влияние на здоровье женщины или плода (ребенка). Однако вопрос о целесообразности назначения препарата должен решаться индивидуально после консультации врача.

### Способ применения и дозы

Местно.

Только для интравагинального применения. Вагинальные таблетки по 100 мг вводят однократно вечером во влагалище, как можно глубже, в положении лежа на спине при слегка согнутых ногах в течение 6 дней. Повторный курс лечения возможен после консультации врача.

### Побочное действие

Зуд, жжение и отек слизистой оболочки влагалища, выделения из влагалища, головная боль, гастралгия, учащенное мочеиспускание, интеркуррентный цистит, ощущение жжения в половом члене у полового партнера, боль во время полового акта.

### Передозировка

Применение препарата в повышенных дозах не вызывает каких-либо реакций и состояний, опасных для жизни. В случае непредусмотрительного применения препарата (внутрь) возможны следующие симптомы: анорексия, тошнота, рвота, гастралгия, нарушение функции печени; редко – сонливость, галлюцинации, поллакиурия, кожные аллергические реакции. Специфического антагониста нет. Необходимо назначать внутрь активированный уголь. При необходимости лечение симптоматическое.

### Взаимодействие с другими лекарственными средствами

При вагинальном введении клотримазол снижает активность амфотерицина В и других полиеновых антибиотиков. При одновременном применении с нистатином активность клотримазола может снижаться.

### Особые указания

Для предотвращения урогенитальной реинфекции необходимо одновременное лечение половых партнеров.

При трихомонозе для более успешного лечения совместно с Клотримазолом следует применять другие лекарственные средства, обладающие системным действием (например, метронидазол внутрь).

При одновременной инфекции половых губ и прилегающих участков (кандидозный вульвит) следует дополнительно проводить местное лечение препаратом Клотримазол крем.

У больных с печеночной недостаточностью следует периодически контролировать функциональное состояние печени.

При появлении признаков гиперчувствительности или раздражения лечение прекращают.

При отсутствии эффекта в течение 4 недель следует подтвердить диагноз.

### Форма выпуска

Таблетки вагинальные 100 мг.

**По 6 таблеток в контурную ячейковую упаковку из пленки поливинилхлоридной и фольги алюминиевой печатной лакированной.**

**1 контурная ячейковая упаковка с инструкцией по применению в картонной пачке.**

### Срок годности

3 года. Не применять после истечения срока годности.

### Условия хранения

В сухом, защищенном от света месте при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

### Отпуск из аптек

Без рецепта.

### Претензии направлять в адрес предприятия-производителя:

ООО «ФАРМАКОР ПРОДАКШН», Россия  
Адрес производства: 198216, г. Санкт-Петербург, Ленинский пр., д. 140, лит. Ж  
Адрес юридический: 194021, г. Санкт-Петербург, 2-й Мурицкий пр., д. 41, лит. А  
тел./факс: (812) 325-23-15 www.pharmacor.ru

03/2011