

ИНСТРУКЦИЯ
по медицинскому применению препарата

ДИОСМЕКТИТ

Регистрационный номер: ЛСР-000247/08

Торговое название препарата: Диосмектит

Международное непатентованное название: Смектитдиоктаэдрический

Лекарственная форма: порошок для приготовления суспензии для приема внутрь.

Состав

Активное вещество: смектит диоктаэдрический – 3 г;
Вспомогательные вещества: глюкоза (декстроза) – 0,749 г, ванилин – 0,004 г,
сахарин растворимый (натрия сахаринат) – 0,007 г.

Описание

Порошок от желтовато- или серовато-белого цвета до серовато- или коричневатого-желтого цвета с запахом ванилина.

Фармакотерапевтическая группа

Противодиарейное средство.

Код АТХ: [A07BC05]

Фармакологические свойства

Фармакодинамика

Препарат природного происхождения, оказывает адсорбирующее действие. Стабилизирует слизистый барьер, образует поливалентные связи с гликопротеинами слизи, увеличивает количество слизи, улучшает ее гастропротекторные свойства (в отношении отрицательного действия ионов водорода HCl, желчных солей, микроорганизмов и их токсинов). Обладает селективными сорбционными свойствами, которые объясняются его дискоидно-кристаллической структурой; адсорбирует находящиеся в просвете желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) бактерии, вирусы. В терапевтических дозах не влияет на моторику кишечника.

Фармокинетика

Не всасывается, выводится из организма в неизменном виде.

Показания к применению

Диарея (аллергического, лекарственного генеза; нарушение режима питания и качественного состава пищи), гастрит, язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки, колит; диарея инфекционного генеза - в составе комплексной терапии.

Симптоматическое лечение изжоги, метеоризма и дискомфорта в животе при заболеваниях ЖКТ.

Противопоказания

Гиперчувствительность, кишечная непроходимость.

Применение при беременности и в период лактации

Возможно применение препарата Диосмектита при беременности и в период лактации по показаниям.

В экспериментальных исследованиях показано, что препарат не оказывает тератогенного действия.

Способ применения и дозы

Взрослым назначают 3 пакета в сутки в течение минимум 3 дней. При *острой диарее* в начале лечения дневная доза может быть удвоена.

Перед приемом содержимое 1 пакета растворить в половине стакана воды. Для получения однородной суспензии следует постепенно высыпать в жидкость порошок, равномерно его размешивая. При эзофагитах препарат предпочтительнее принимать после еды, в других случаях - между приемами пищи.

Детям в возрасте до 1 года назначают 1 пакет в сутки; от 1 до 2 лет - 2 пакета в сутки; старше 2 лет - 2-3 пакета в сутки. Курс лечения - минимум 3 дня. Содержимое пакета растворяют в детской бутылочке, рассчитанной на 50 мл воды, и распределяют на несколько приемов в течение дня, или тщательно размешивают с каким-нибудь полужидким продуктом: суп, каша, компот, пюре, детское питание.

Побочное действие

Запоры, аллергические реакции.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Уменьшает скорость и степень всасывания одновременно принимаемых лекарственных средств.

Особые указания

Пациент должен обратиться к врачу, если после приема препарата в течение 3 дней не происходит уменьшения симптомов, а также в случаях, когда боли в животе сопровождаются температурой или рвотой.

Не следует назначать одновременно с другими препаратами. Любое другое лекарственное средство рекомендуется принимать за 1-1.5 ч до приема Диосмектита.

Форма выпуска

Порошок для приготовления суспензии для приема внутрь 3г.

По 3,76 г препарата (3 г активного вещества) в термосвариваемые пакеты.

По 5, 10, 20 или 30 пакетов с инструкцией по применению в пачку из картона.

Условия хранения

При температуре не выше 25°C.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

4 года.

По окончании срока годности, указанного на упаковке, препарат не использовать.

Условия отпуска из аптек

Без рецепта.

Производитель/организация, принимающая претензии

ООО "ФАРМАКОПРОДАКШН", Россия

Адрес производства: 198216, г. Санкт-Петербург, Ленинский пр., д. 140, лит. Ж

Адрес юридический: 194021, г. Санкт-Петербург, 2-й Муринский пр., д. 41, лит. А

тел./факс: (812) 325-23-15

www.pharmacor.ru