

ИНСТРУКЦИЯ
по медицинскому применению препарата
ГЛЮКОЗАМИН

Регистрационный номер: ЛСР-009268/09

Торговое название: Глюкозамин

Международное непатентованное название: глюкозамин

Лекарственная форма: порошок для приготовления раствора для приема внутрь.

Состав:

Один пакет содержит

Активное вещество: глюкозамина сульфат натрия хлорид 1,884 г (эквивалент глюкозамина сульфата – 1,5 г)

Вспомогательные вещества: аспартам, сорбитол, макрогол-4000 (полиэтиленгликоль-4000), кислота лимонная моногидрат до получения массы содержимого одного пакета 3,95 г.

Описание

Белый или белый со слегка кремоватым оттенком гранулированный порошок.

Фармакотерапевтическая группа: Репарации тканей стимулятор.

Код АТХ: M01AX05

Фармакологические свойства

Фармакодинамика

Противовоспалительное средство, восполняет эндогенный дефицит глюкозамина, увеличивает проницаемость суставной капсулы, восстанавливает ферментативные процессы в клетках синовиальной мембраны и суставного хряща. Способствует фиксации серы в процессе синтеза хондроитинсерной кислоты, облегчает нормальное отложение кальция в костной ткани, тормозит развитие дегенеративных процессов в суставах, восстанавливает их функцию, уменьшая суставные боли.

Фармакокинетика

Быстро и полностью всасывается в тонкой кишке. Биодоступность 26%, период полувыведения 70 часов.

Показания к применению

Остеoarтроз периферических суставов, суставов позвоночника, остеохондроз.

Противопоказания

Индивидуальная повышенная чувствительность к глюкозамину и другим компонентам препарата. Тяжелая хроническая почечная недостаточность, фенилкетонурия, беременность, период лактации, детский возраст до 12 лет.

С осторожностью: бронхиальная астма, сахарный диабет. При непереносимости морепродуктов (креветки, моллюски) вероятность развития аллергических реакций на препарат возрастает.

Способ применения и дозы

Взрослым и детям с 12 лет.

Внутрь. Содержимое одного пакета растворяют в 200 мл воды, принимают 1 раз в сутки в течение 6 – 12 недель. По назначению врача курс лечения можно повторять с интервалом 2 месяца.

Побочное действие

Со стороны пищеварительной системы: гастралгия, метеоризм, запоры или диарея.

Аллергические реакции - крапивница, зуд.

Передозировка

Случаи передозировки неизвестны. *Лечение:* промывание желудка, симптоматическая терапия.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Совместим с нестероидными противовоспалительными препаратами, парацетамолом и глюкокортикостероидами.

Увеличивает абсорбцию тетрациклинов, уменьшает – полусинтетических пенициллинов, хлорамфеникола.

Форма выпуска

Порошок для приготовления раствора для приема внутрь 1,5 г.

По 3,95 г в термосвариваемые пакеты из материала пленочного комбинированного многослойного.

По 5, 10, 20 или 30 пакетов с инструкцией по применению в пачку из картона.

Условия хранения

Список Б. В сухом, защищенном от света месте при температуре не выше 30 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

3 года.

Не использовать по истечении срока годности.

Условия отпуска из аптек

По рецепту

Претензии направлять в адрес предприятия-производителя:

ООО «ФАРМАКОР ПРОДАКШН», Россия

Адрес производства:

198216, г. Санкт-Петербург, Ленинский пр., д. 140, лит. Ж

Адрес юридический:

194021, г. Санкт-Петербург, 2-й Муриноский пр., д. 41, лит. А

тел./факс: (812) 325-23-15