



Производитель благодарит Вас за выбор препарата Лоперамид и гарантирует его высокое качество.

ИНСТРУКЦИЯ по медицинскому применению препарата

ЛОПЕРАМИД

Регистрационный номер: ЛС-000947

Торговое название: Лоперамид

Международное непатентованное название: лоперамид

Химическое название: 4-(4-Хлорфенил)-4-гидроксид-N,N-диметил- α , α -дифенил-1-пиперидин бутанамид (в виде гидрохлорида).

Лекарственная форма: таблетки

Состав: 1 таблетка содержит: *активное вещество:* лоперамида гидрохлорид - 2 мг; *вспомогательные вещества:* лактоза, поливинилпирролидон (повидон), крахмал картофельный, магния стеарат.

Описание: Таблетки белого или белого с желтоватым оттенком цвета, плоскоцилиндрические, с фаской и риской.

Фармакотерапевтическая группа: противодиарейное средство.
КОД АТХ: A07DA03

Фармакологические свойства

Снижает тонус и моторику гладкой мускулатуры кишечника, замедляет пассаж содержимого кишечника, уменьшает выделение жидкости и электролитов с фекалиями. Повышает тонус анального сфинктера. Действие наступает быстро и продолжается 4 - 6 часов.

Фармакокинетика.

Абсорбция – 40 %. Связь с белками плазмы – 97 %. Период полувыведения – 9 – 14 ч. Не проникает через гематоэнцефалический барьер. Практически полностью метаболизируется в печени путем конъюгации. Выводится преимущественно с желчью и почками.

Показания к применению

Симптоматическое лечение острой и хронической диареи различного генеза (аллергического, эмоционального, лекарственного, лучевого; при изменении режима питания и качественного состава пищи, при нарушении метаболизма и всасывания; как вспомогательное средство при диарее инфекционного генеза).

Регуляция стула у пациентов с илеостомой.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к препарату, дивертикулез, кишечная непроходимость, язвенный колит в стадии обострения, диарея на фоне острого псевдомембранозного энтероколита, в виде монотерапии – дизентерия и другие инфекции желудочно-кишечного тракта; беременность (I триместр), период лактации, лоперамид в таблетках не назначают детям до 6 лет.

С *осторожностью* – печеночная недостаточность.

Способ применения и дозы

Внутрь. Взрослым при острой и хронической диарее первоначально назначают 2 таблетки (4 мг), затем по 1 таблетке (2 мг) после каждого акта дефекации в случае жидкого стула. Максимальная суточная доза – 8 таблеток (16 мг).

Детям старше 6 лет назначают по 1 таблетке (2 мг) после каждого акта дефекации в случае жидкого стула. Максимальная суточная доза – 3 таблетки (6 мг).

После нормализации стула или при отсутствии стула более 12 часов лечение лоперамидом следует прекратить.

Побочное действие

Головная боль; гастралгия, сухость во рту, аллергические реакции (кожная сыпь), сонливость или бессонница, головное окружение, кишечная колика, тошнота, рвота, запор. Крайне редко – кишечная непроходимость.

Передозировка

Симптомы: угнетение центральной нервной системы (ступор, нарушение координации, сонливость, миоз, мышечная гипертония, угнетение дыхания), кишечная непроходимость.

Лечение: антидот – налоксон; учитывая, что продолжительность действия лоперамида больше, чем у налоксона, возможно повторное введение последнего.

Симптоматическое лечение: активированный уголь, промывание желудка, искусственная вентиляция легких.

Необходимо медицинское наблюдение, по крайней мере, в течение 48 часов.

Особые указания

При отсутствии эффекта после 2-х суток применения лоперамида необходимо уточнить диагноз и исключить инфекционный генез диареи.

Форма выпуска

Таблетки 2 мг.

По 10 или 20 таблеток в контурную ячейковую упаковку. 1, 2 контурные упаковки по 10 таблеток или 1 контурную упаковку по 20 таблеток с инструкцией по применению в пачку из картона.

По 100 или 200 таблеток во флакон из полиэтилена высокого давления. 72 флакона с инструкциями по применению в коробку из картона (для стационаров).

Условия хранения

В сухом, защищенном от света месте при температуре не выше 25°C. Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

3 года. Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Условия отпуска из аптек

Без рецепта.

Производитель

ООО "Фармакор продакшн", Россия

Адрес юридический: 194021, г. Санкт-Петербург, 2-й Муринский пр., д.41, лит. А

Адрес производств: 198216, г. Санкт-Петербург, Ленинский пр., д. 140, лит. Ж

Факс: (812) 325-23-15 www.pharmacor.ru