



**ИНСТРУКЦИЯ**  
по медицинскому применению препарата

# ЛОПЕРАМИД

**Регистрационный номер:** ЛС-000947

**Торговое название:** Лоперамид

**Международное непатентованное название:** лоперамид

**Химическое название:** 4-(4-Хлорфенил)-4-гидрокси-N,N-диметил- $\alpha$ , $\alpha$ -дифенил-1-пиперидин бутанамид (в виде гидрохлорида).

**Лекарственная форма:** таблетки

**Состав:** 1 таблетка содержит: *активное вещество:* лоперамида гидрохлорид - 2 мг; *вспомогательные вещества:* лактоза, поливинилпирролидон (повидон), крахмал картофельный, магния стеарат.

**Описание:** Таблетки белого или белого с желтоватым оттенком цвета, плоскоцилиндрические, с фаской и риской.

**Фармакотерапевтическая группа:** противодиарейное средство.  
Код АТХ: А07ДА03

#### **Фармакологические свойства**

Снижает тонус и моторику гладкой мускулатуры кишечника, замедляет пассаж содержимого кишечника, уменьшает выделение жидкости и электролитов с фекалиями. Повышает тонус анального сфинктера. Действие наступает быстро и продолжается 4 - 6 часов.

#### *Фармакокинетика.*

Абсорбция – 40 %. Связь с белками плазмы – 97 %. Период полувыведения – 9 – 14 ч. Не проникает через гематоэнцефалический барьер. Практически полностью метаболизируется в печени путем конъюгации. Выводится преимущественно с желчью и почками.

#### **Показания к применению**

Симптоматическое лечение острой и хронической диареи различного генеза (аллергического, эмоционального, лекарственного, лучевого; при изменении режима питания и качественного состава пищи, при нарушении метаболизма и всасывания; как вспомогательное средство при диарее инфекционного генеза).

Регуляция стула у пациентов с илеостомой.

#### **Противопоказания**

Повышенная чувствительность к препарату, дивертикулез, кишечная непроходимость, язвенный колит в стадии обострения, диарея на фоне острого псевдомембранозного энтероколита, в виде монотерапии – дизентерия и другие инфекции желудочно-кишечного тракта; беременность (I триместр), период лактации, лоперамид в таблетках не назначают детям до 6 лет.

*С осторожностью* – печеночная недостаточность.

**Способ применения и дозы**

Внутрь. Взрослым при острой и хронической диарее первоначально назначают 2 таблетки (4 мг), затем по 1 таблетке (2 мг) после каждого акта дефекации в случае жидкого стула. Максимальная суточная доза – 8 таблеток (16 мг).

Детям старше 6 лет назначают по 1 таблетке (2 мг) после каждого акта дефекации в случае жидкого стула. Максимальная суточная доза – 3 таблетки (6 мг).

После нормализации стула или при отсутствии стула более 12 часов лечение лоперамидом следует прекратить.

**Побочное действие**

Головная боль; гастралгия, сухость во рту, аллергические реакции (кожная сыпь), сонливость или бессонница, головокружение, кишечная колика, тошнота, рвота, запор. Крайне редко – кишечная непроходимость.

**Передозировка**

*Симптомы:* угнетение центральной нервной системы (ступор, нарушение координации, сонливость, миоз, мышечная гипертония, угнетение дыхания), кишечная непроходимость.

*Лечение:* антидот – налоксон; учитывая, что продолжительность действия лоперамида больше, чем у налоксона, возможно повторное введение последнего.

Симптоматическое лечение: активированный уголь, промывание желудка, искусственная вентиляция легких.

Необходимо медицинское наблюдение, по крайней мере, в течение 48 часов.

**Особые указания**

При отсутствии эффекта после 2-х суток применения лоперамида необходимо уточнить диагноз и исключить инфекционный генез диареи.

**Форма выпуска**

Таблетки 2 мг.

По 10 или 20 таблеток в контурную ячейковую упаковку. 1, 2 контурные упаковки по 10 таблеток или 1 контурную упаковку по 20 таблеток с инструкцией по применению в пачку из картона.

По 100 или 200 таблеток во флакон из полиэтилена высокого давления. 72 флакона с инструкциями по применению в коробку из картона (для стационаров).

**Условия хранения**

В сухом, защищенном от света месте при температуре не выше 25°C. Хранить в недоступном для детей месте.

**Срок годности**

3 года. Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.

**Условия отпуска из аптек**

Без рецепта.

**Производитель**

ООО "Фармакор продакшн", Россия

Адрес юридический:

194021, г. Санкт-Петербург, 2-й Муринский пр., д.41, лит. А

Тел./факс: (812) 325-23-15

Адрес производства:

198216, г. Санкт-Петербург, Ленинский пр., д.140, лит. Ж

Тел./факс: (812) 320-76-86