

**Биологически активная добавка к пище  
«БерриВитС.Эхинацея и бузина»  
(стики по 4,0 г)  
Инструкция по применению\***

**Область применения:** в качестве биологически активной добавки к пище - дополнительного источника оксикоричных кислот, витамина С и цинка.

**Состав:** натуральный подсластитель фруктоза, наполнитель мальтодекстрин, эхинацеи экстракт, аронии экстракт, витамин С, бузины черной плодов экстракт, регулятор кислотности лимонная кислота, цинка лактат, агент антислеживающий диоксид кремния, ароматизатор пищевой “Черная смородина”.

*\* Информация для потребителя носит ознакомительный характер, перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом. Информация о компонентах является общедоступной.*

**Содержание биологически активных веществ:**

Биологически активное вещество	Содержание в-ва в 1 стике, не менее, мг	Содержание в-ва в рекомендуемой суточной дозе (в 2-х стиках), мг, не менее	% от установленных нормативов
Цинк	4,5	9,0	60%*
Витамин С (аскорбиновая кислота)	59	118	196%*, но не превышает ВДУ
Оксикоричные кислоты в пересчете на цикориевую кислоту	4,0	8,0	80%**

\* Рекомендуемый уровень суточного потребления согласно ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки», утвержденному Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 года № 881.

\*\* Адекватный уровень потребления согласно «Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)», утвержденным решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299.

**Пищевая и энергетическая ценность БАД «БерриВитС.Эхинацея и бузина».**

Пищевая ценность одной порции продукта (4,0 г):	
Белки	0,0075 г
Жиры	0,001 г
Углеводы	3,59 г

Энергетическая ценность (калорийность) одной порции продукта: 14,4 ккал/60,3 кДж

\*указанные значения могут варьироваться в зависимости от свойств используемого сырья

**Рекомендации по применению:** внутрь, взрослым по 1 стикку 1- 2 раза в день во время приема пищи.

Содержимое одного стика или одну мерную ложку (4,0 г) продукта растворить в 100-150 мл теплой или горячей воды, тщательно перемешать, полученный раствор выпить. Раствор следует готовить непосредственно перед употреблением. Допускается образование осадка в связи с использованием натурального растительного сырья.

Продолжительность приема - 1 месяц. При необходимости прием можно повторить.

Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.

**Способствует:**

- поддержанию защитных сил организма и активности иммунной системы при сезонных простудных заболеваниях;
- восполнению дефицита витамина С, цинка;
- восполнению необходимого количества жидкости в организме при повышенной температуре;
- восстановлению организма после болезненных состояний (простуды, гриппа).

Может применяться в целях профилактики и как компонент вспомогательной терапии для снижения риска развития простудных заболеваний.

**Форма выпуска:** стики по 4,0 г

**Противопоказания:** индивидуальная непереносимость компонентов, беременность, кормление грудью.

**Не является лекарством.**

**Условия хранения:** в защищенном от попадания прямых солнечных лучей и недоступном для детей месте при температуре не выше +25° С и относительной влажности воздуха не более 75%.

**Условия реализации:** места реализация определяются национальным законодательством государств-членов Евразийского экономического союза.

**Срок годности:** 2 года.

**Свидетельство о государственной регистрации**

**№ ТУ 10.89.19-049-48018357-2020**

Изготовитель/организация, принимающая претензии: ООО «ФАРМАКОР ПРОДАКШН», РФ, 197375, Санкт-Петербург, ул. Репищева, д. 14, корп. 5, оф. 247, (адрес производства: Санкт-Петербург, ул. Репищева, д. 14, корп. 7.)

Тел. 8-800-333-30-20 (многоканальный)

[www.pharmprod.ru](http://www.pharmprod.ru)

**Система менеджмента безопасности и качества пищевой продукции предприятия сертифицирована на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 22000-2007 (ISO 22000:2005) и ГОСТ Р 52249-2009 (GMP).**

